Thomas J. Golnik

SKRIPT

**für den Biologieunterricht
der Jahrgangsstufe K 3**

Liebe Kollegiatin, lieber Kollegiat,

dieses Skript für den Biologieunterricht der Oberstufe soll es Ihnen leichter machen, sich in der großen Fülle der Themen und Anforderungen zu orientieren, und Ihnen besonders auch dabei helfen, den Unterricht effizient vor- und nachzubereiten. Sie finden hier die Inhalte des Biologieunterrichts der Jahrgangsstufe K III in einer Form zusammengestellt, die Ihnen für jedes Kapitel und jedes Thema genau

aufzeigt, welche Kenntnisse und Fertigkeiten Sie jeweils erwerben, welches Vorwissen Sie reaktivieren sollten und welche Leistungen anschließend von Ihnen erwartet werden. Ich hoffe, dass dieses Heft ein nützlicher Begleiter für Sie sein wird und Ihnen dabei helfen kann, im Biologieunterricht maximale Erfolge zu erzielen.

Thomas J. Golnik

Übersicht über den Biologieunterricht der Jahrgangsstufe K 3

= Gymnasium, Klasse 12

B 12.1 Neuronale Informationsverarbeitung

- Bau und Leistungen des Nervensystems
- Modellvorstellungen zu den elektrochemischen Grundlagen der Erregungsleitung und Informationsverarbeitung (Ruhepotenzial, Aktionspotenzial, Synapse)
- Beeinflussbarkeit des Nervensystems durch Gifte, Medikamente und Suchtmittel

LB (11. Kl.)
145–167
S 3–5

B 12.2 Evolution

Evolutionsforschung

- Ähnlichkeiten und Unähnlichkeiten bei Lebewesen: Belege für Verwandtschaft und Evolution
- Entwicklung des Evolutionsgedankens

LB 6–25
S 5–8

Mechanismen der Evolution

- Zusammenwirken der Evolutionsfaktoren als Ursache der Biodiversität gemäß der erweiterten Evolutionstheorie

LB 26–39
S 8–11

Die Geschichte des Lebens auf der Erde

- Von der Entstehung des Lebens bis zur Gegenwart
- Evolution des Menschen

LB 40–61
S 11–14

B 12.3 Verhaltensbiologie

Genetisch bedingtes Verhalten

- unbedingte Reflexe und Instinkthandlungen
- genetisch bedingtes Verhalten beim Menschen

LB 82–91
S 14/15

Erfahrungsbedingtes Verhalten

- Prägungen und Konditionierungen
- prägungsähnliches Verhalten beim Menschen

LB 92–99
S 15/16

Sozialverhalten

- Kosten und Nutzen des Soziallebens
- evolutionäre Bedingtheit sozialer Verhaltensweisen: Kooperation, Kommunikation, Aggression und Aggressionskontrolle, Sexualverhalten

LB 100–127
S 17–20

Legende der Abkürzungen

E = Erarbeitung neuer Inhalte; **W1** = Wiederholung aus der 1. Jahrgangsstufe (K 1);

W2 = Wiederholung aus der 2. Jahrgangsstufe (K 2); **W3** = Wiederholung aus der 3. Jahrgangsstufe (K 3)

Seitenzahlen nach dem Muster **LB 5** beziehen sich aufs Lehrbuch, nach dem Muster **S 5** auf dieses Skript.

Vom Lehrplan verbindlich vorgeschriebene Inhalte sind mit einem gelben Balken am linken Rand markiert.

Neuronale Informationsverarbeitung

Kenntnisse

- Neuron als Grundbaustein des Nervensystems
- Ruhe- und Aktionspotenzial sowie Erregungsleitung am Neuron
- Übertragung von Erregungen zwischen Zellen mittels chemischer Synapsen
- Codierung und Verrechnung von Informationen
- Beeinflussung des Nervensystems durch Gifte, Medikamente und Suchtmittel

Fertigkeiten

- Anfertigen einer beschrifteten Skizze vom Bau eines Neurons
- Beschreiben der Entstehung des Ruhepotenzials und der Erregungsleitung; Beschreiben des Ablaufs eines Aktionspotenzials unter Einbeziehung eines Diagramms; Beschreiben der Erregungsübertragung an einer Synapse unter Einbeziehung einer beschrifteten Skizze
- Interpretation von grafisch dargestellten Verrechnungsmustern und Giftwirkungen an Neuronen

1. Das Neuron (Nervenzelle) – Grundbaustein des Nervensystems

- E – Aufgaben des Nervensystems; **Zentralnervensystem (ZNS)** und **peripheres Nervensystem (PNS)** LB (11. Kl.) 159
 – Verarbeitung von Reizen nach Umwandlung in **Erregungen** (elektrische Impulse)
- W2 Zellbestandteile: Zellmembran, Zellkern, Ribosomen, ER, Mitochondrien S (K 2) 3/4
- E **Bau eines Neurons** LB (11. Kl.) 147
 – **Zellkörper**, **Dendriten**, **Axonhügel**, **Axon**, **Myelinscheide** aus **Gliazellen (Schwann'sche Zellen)** und **Schnürringen**, **präsynaptische Endigungen (Endknöpfchen)**, **Synapsen**

2. Das Ruhepotenzial (RP)

- W2 Biomembran; Diffusion und Osmose; Kanal- und Carriertransport S (K 2) 3/4
- E – **Ruhepotenzial**: elektrische Spannung an der Membran eines unerregten **Neurons**: Innenseite im Vergleich zur Außenseite der Membran **-70 mV** LB (11. Kl.) 151
 – **Bedeutung**: Möglichkeit zur Erzeugung eines Impulses (= Informationsübertragung) durch Änderung des Potenzials (Bildung eines **Aktionspotenzials**)
 – **Voraussetzungen für die Ausbildung des RP** LB (11. Kl.) 148/149
 (1) unterschiedliche **Konzentration von Ionen** auf beiden Seiten der Membran (**An⁻**, **K⁺**, **Na⁺**, **Cl⁻**)
 (2) unterschiedlich gute Durchlässigkeit der Membran für diese Ionen (**selektive Permeabilität**)
 – **Entstehung und Aufrechterhaltung des RP** LB (11. Kl.) 151
 • **K⁺-Ausstrom** gemäß dem **Konzentrationsgradienten** → Aufbau eines **Ladungsgradienten** (Außenseite positiv, Innenseite negativ), Stabilisierung bei etwa **-70 mV (= RP)**
 • **Einsickern von Na⁺** in die Zelle gemäß dem **Konzentrations-** und **Ladungsgradienten** („**Na-Leckstrom**“) → allmählicher Abbau des Ladungsgradienten → Gefährdung des RP
 • **Na-K-Pumpen (Carrier-Proteine)**: ständiger **aktiver Transport (ATP-Verbrauch)** von Na⁺ nach außen und K⁺ nach innen → Aufrechterhaltung des RP

3. Das Aktionspotenzial (AP)

LB (11. Kl.) 152/153

- E – **Aktionspotenzial**: kurzfristige Umkehrung der Spannung an der **Axon-Membran** (Innenseite im Vergleich zur Außenseite der Membran **+30 mV**), die als **Erregung** weitergeleitet werden kann
 – **Voraussetzungen für die Ausbildung eines AP**
 (1) **Ruhepotenzial (RP)**; (2) Vorhandensein **spannungsabhängiger Kanalproteine**: **Na⁺-** und **K⁺-Kanäle**; (3) **überschwellige Reizung** des Neurons: **Schwellenwert -40 mV**
 – **Ablauf eines AP**
 • **überschwelliger Reiz** („**Alles-oder-nichts-Gesetz**“) →
 a) schnelle Öffnung von **spannungsabhängigen Na⁺-Kanälen** → plötzlicher Einstrom von Na⁺ gemäß dem **Konzentrations-** und **Ladungsgradienten** → **Depolarisation** der Membran und **Potenzialumkehr** (**-70 mV → +30 mV**) → Schließen der Na⁺-Kanäle
 b) verzögerte Öffnung von **spannungsabhängigen K⁺-Kanälen** → K⁺-Ausstrom gemäß dem **Konzentrations-** und **Ladungsgradienten** → **Repolarisation** (**+30 mV → -70 mV**) und **Hyperpolarisation** (**-70 mV → -80 mV**) → Schließen der K⁺-Kanäle
 • **Wiederherstellung des RP (-70 mV)** durch **Na-K-Pumpen**
 – **zeitlicher Verlauf**
 0 ms Zeitpunkt des Überschreitens des **Schwellenwertes**: Öffnen der Na⁺-Kanäle
 1 ms Erreichen des **Aktionspotenzials** (**+30 mV**); Schließen der Na⁺-, Öffnen der K⁺-Kanäle
 2 ms **Repolarisation** und **Hyperpolarisation**; Schließen der K⁺-Kanäle; Ende der **absoluten Refraktärzeit**
 5 ms Stabilisierung des **RP**; Ende der **relativen Refraktärzeit**

- **Refraktärzeiten:**
 - **absolute Refraktärzeit:** Ionenverteilung des AP erlaubt kein neues AP
 - **relative Refraktärzeit:** RP noch nicht stabilisiert (**Hyperpolarisation**) → neuer Reiz muss stärker sein als zuvor, um den **Schwellenwert** zu überschreiten

4. Erregungsleitung am Axon

LB (11. Kl.) 154/155

- E - **Erregungsleitung** (= Ausbildung neuer **AP** in räumlicher Entfernung vom alten AP) am **Axon** stets nur in eine Richtung (in der anderen herrscht **Refraktärzeit!**)
- E **Erregungsleitung bei wirbellosten Tieren** (Axon ohne **Myelinscheide**; **markloses Axon**)
 - **AP** an einer Stelle des **Axons** → **Depolarisation** benachbarter Bereiche durch **Ionenwanderung** („**Kreisströmchen**“) → Auslösen neuer AP in diesen Bereichen, wenn die **Depolarisation** dort den **Schwellenwert** erreicht: **kontinuierliche Erregungsleitung**
 - Geschwindigkeit der Erregungsleitung nimmt mit steigendem Durchmesser des Axons zu; **Ursache:** größerer Durchmesser des Axons → größerer Durchmesser der **Kreisströmchen**
- E **Erregungsleitung bei Wirbeltieren** (Axon mit **Myelinscheide**; **markhaltiges Axon**)
 - **Ionenwanderung** kann erst am nächsten **Schnürring** zu einer **Depolarisation** führen → erst dort ist die Ausbildung eines neuen **AP** möglich, da die **Myelinscheidenzellen** die **Axon-Membran** isolieren: **saltatorische Erregungsleitung**
 - **Vorteile:** viel schneller sowie energiesparender (da nur an den **Schnürringen** das **RP** durch **ATP**-verbrauchende **Na-K-Pumpen** wiederhergestellt werden muss), kleinerer Axon-Durchmesser

5. Erregungsübertragung an chemischen Synapsen

LB (11. Kl.) 156

- E **Bau einer Synapse:** Kontaktstelle zwischen zwei **Neuronen** (**interneuronal**) bzw. zwischen Neuron und Muskelzelle (**neuro-muskulär**)
 - **präsynaptische Endigung** (**Endknöpfchen**) mit **Vesikeln**, in denen sich ein Botenstoff (**Neurotransmitter**, z. B. **Acetylcholin**) befindet
 - **synaptischer Spalt** zwischen den beiden Zellen (ca. 20 nm breit)
 - **postsynaptische Membran**
- E **Ablauf der Erregungsübertragung an einer Acetylcholin-Synapse**
 - Ankunft eines **AP** an der **präsynaptischen Endigung** → Öffnung **spannungsabhängiger Ca²⁺-Kanäle** → Einstrom von Ca²⁺ → Wanderung der **Transmittervesikel** zur **präsynaptischen Membran**
 - Ausschüttung des **Acetylcholins** (ACh) in den **synaptischen Spalt** (**Exozytose**) → **Diffusion** durch den synaptischen Spalt
 - Anlagerung des ACh an **transmitterabhängige Na⁺-Kanäle** in der **postsynaptischen Membran** (**Schlüssel-Schloss-Prinzip**) → Öffnung der Na⁺-Kanäle → Na⁺-Einstrom → **Depolarisation** der postsynaptischen Membran (**postsynaptisches Potenzial, PSP**); Ausweitung innerhalb der postsynaptischen Zelle durch **Ionenwanderung**
 - Spaltung des ACh durch das **Enzym Acetylcholin-Esterase** in **Essigsäure** und **Cholin**; Wiederaufnahme der Spaltprodukte in die **präsynaptische Endigung** → Neusynthese von ACh aus den Spaltprodukten unter **ATP**-Verbrauch

Ein **AP** kann in einem postsynaptischen Neuron erst an dessen **Axonhügel** entstehen, da erst dort **spannungsabhängige Na⁺-Kanäle** vorhanden sind.

6. Codierung der Reizstärke und Verrechnung von Impulsen

LB (11. Kl.) 157

- E **Codierung der Reizstärke** durch die **AP-Frequenz** (**Frequenz:** Anzahl pro Zeiteinheit): Reiz mit hoher Intensität → hohe AP-Frequenz
- E **Verrechnung von Impulsen**

Verschiedene **Neurotransmitter** öffnen verschiedene **transmitterabhängige Kanäle** (Bindung nach dem **Schlüssel-Schloss-Prinzip**); deshalb unterscheidet man:

 - **erregende Synapsen:** Neurotransmitter öffnen in der **postsynaptischen Membran Na⁺-Kanäle** → **Depolarisation** → **erregendes postsynaptisches Potenzial (EPSP)**
 - **hemmende Synapsen:** Neurotransmitter öffnen in der postsynaptischen Membran **K⁺-** oder **Cl⁻-Kanäle** → **Hyperpolarisation** → **inhibitorisches** (hemmendes) **postsynaptisches Potenzial (IPSP)**

Summation (Verrechnung) der eingehenden EPSP und IPSP → ist das resultierende **PSP** am **Axonhügel** so stark, dass der **Schwellenwert** erreicht wird, wird dort ein neues **AP** ausgelöst, das über das **Axon** weitergeleitet wird.

7. Beeinflussung der Tätigkeit von Synapsen durch Gifte, Medikamente und Suchtmittel

LB (11. Kl.) 158

W3 Erregungsübertragung an Synapsen

E **Neurotoxine** (Nervengifte) bewirken entweder, dass die postsynaptische Membran trotz eines eingehenden AP an der präsynaptischen Endigung nicht depolarisiert wird (schlafte Lähmung) oder aber, dass bei der postsynaptischen Zelle PSP ausgelöst werden, obwohl gar keine AP eingegangen sind (starre oder Krampfähmung).

Beispiele:

- **schlafte Lähmung**: Verhinderung der ACh-Ausschüttung; Blockade der ACh-Rezeptoren in der postsynaptischen Membran durch ACh-ähnliche Stoffe, die aber den Kanal nicht öffnen
- **starre Lähmung**: Öffnung der ACh-Rezeptoren in der postsynaptischen Membran durch ACh-ähnliche Stoffe; Hemmung der ACh-Esterase

Neurologisch wirksame Medikamente und Suchtmittel hemmen oder fördern die Erregungsübertragung an Synapsen in bestimmten Teilen des Zentralnervensystems (Schmerz-, Belohnungszentren).

Evolutionforschung

Kenntnisse

- natürliches Ordnungssystem für die Biodiversität der Erde; Artbegriffe
- Homologie und Analogie; Homologien in der Morphologie, Anatomie, Embryologie und Molekularbiologie
- Fossilien
- Entwicklung des Evolutionsgedankens: CUVIER, LAMARCK, DARWIN

Fertigkeiten

- Begründen der Verwandtschaft von Lebewesen unter Anwendung der Homologiekriterien; Unterscheiden von Homologie und Analogie
- Erläutern des Evolutionsgeschehens entsprechend den Theorien von LAMARCK und DARWIN

1. Grundprinzipien und Grundfragen

E **Grundprinzipien**

Evolutionforschung beruht – wie jede naturwissenschaftliche Forschung – auf zwei Prinzipien:

1. **Falsifizierungsprinzip**: Beobachtungen → Hypothesen (Modellvorstellungen) → Vorhersagen → Überprüfung (durch Experimente / neue Beobachtungen) → Bestätigung (Verifizierung) oder Widerlegung (Falsifizierung) der Vorhersagen → falsifizierte Hypothesen werden fallengelassen/abgewandelt, bislang nicht falsifizierte Hypothesen gelten als gegenwärtiges Wissen; **Theorie**: mehrere miteinander in Beziehung stehende Hypothesen
2. **Aktualitätsprinzip**: Naturgesetze, die heute gültig sind, wirkten in der Vergangenheit ebenso

E **Grundfragen**

1. Dominiert in der belebten Natur Statik und Konstanz oder Dynamik und Evolution?
2. Wodurch wird die Konstanz bzw. die Evolution verursacht?
3. Worin liegt letztlich der Sinn des Ganzen, wo sein Ziel?

2. Biodiversität, Ordnungssysteme und Artbegriff

E **Biodiversität**: Vielfalt verschiedener Arten von Lebewesen (derzeit mehr als 1,5 Mio. Arten) LB 7

E **Ordnungssysteme** für die Vielfalt der Lebewesen LB 7, 10, 12

1. **künstliche Systeme**: Lebewesen werden nach willkürlich vom Menschen festgelegten Kriterien (z. B. nach ihrem Lebensraum, ihrer Größe usw.) geordnet; z. B. ARISTOTELES, Conrad GESNER
2. **natürliches System**: Lebewesen werden nach dem Grad ihrer Verwandtschaft geordnet, wobei nahe oder weite Verwandtschaft durch mehr oder weniger große Ähnlichkeit bestimmt wird: „System abgestufter Ähnlichkeiten“; begründet durch Carl von LINNÉ (*Systema Naturae*, 1735)

E **Definition der Art (Artbegriff)**

LB 12

- **morphologischer Artbegriff**: Lebewesen, die in allen wesentlichen Merkmalen übereinstimmen
- **biologischer Artbegriff**: Lebewesen, die miteinander fruchtbare Nachkommen haben können

3. Analogie und Homologie

LB 13, 20

E Einerseits ist nicht jede beobachtbare Ähnlichkeit auch wirklich ein Zeichen von Verwandtschaft; andererseits können auch verwandte Arten in bestimmten Aspekten auf den ersten Blick recht unähnlich sein. *Erklärung:* Folge der Anpasstheit an den jeweiligen Lebensraum

Analogie

verschiedene Grundbaupläne, die in Anpassung an den gleichen Lebensraum gleiche Funktionen entwickelt haben → Ähnlichkeit ohne Verwandtschaft

Homologie

gleicher Grundbauplan, der sich in Anpassung an verschiedene Lebensräume spezifisch verändert haben kann → Verschiedenheit trotz Verwandtschaft

4. Homologien als Belege für die evolutionäre Verwandtschaft von Lebewesen

- E **Homologien** werden von verschiedenen Disziplinen der Biologie untersucht, z. B.:
- **Morphologie** und **Anatomie** (Lehre vom äußeren und inneren Bau): Homologien im Körperbau
 - Embryologie (Lehre von den frühen Entwicklungsstadien): Homologien in den **Embryonen**
 - Biochemie (Lehre von den Stoffwechselprozessen): Homologien in der Struktur von **Proteinen** (z. B. **Enzymen**) und den daraus resultierenden Stoffwechselwegen
 - Molekulargenetik (Lehre von der Vererbung auf molekularer Ebene): Homologien in der **DNA**
 - **Ethologie** (Lehre vom Verhalten): Homologien in Verhaltensweisen
 - **Paläontologie** (Lehre von den Lebewesen der Vorzeit): Homologien zwischen **rezenten** (heutigen) Lebewesen und **Fossilien**

5. Belege aus der Morphologie und Anatomie

LB 14/15

- E **Homologiekriterien:** mindestens eines muss erfüllt sein, um von **Homologie** sprechen zu können
1. **Kriterium der Lage:** Organe sind homolog, wenn sie im Gefügesystem verschiedener Organismen die gleiche Lage im Gesamtgefüge und zueinander haben.
 2. **Kriterium der spezifischen Struktur** (spezifischen Qualität): Organe sind – trotz unterschiedlicher Lage – homolog, wenn sie in zahlreichen Einzelheiten ihres Baus übereinstimmen.
 3. **Kriterium der Stetigkeit** (Kontinuität): Organe sind – trotz möglicherweise unterschiedlicher Lage und/oder Unähnlichkeit im Bau – homolog, wenn sie sich über eine Reihe von Zwischenformen miteinander verbinden lassen (**Entwicklungsreihen**).
- Erweisen sich bestimmte Organe bei verschiedenen Lebewesen als homolog, dann sind es in der Regel auch die übrigen (Korrelationsregel) → erlaubt das Aufstellen von Grundbauplänen für Gruppen verwandter Lebewesen
- E **Entwicklungsreihen** zeigen die allmähliche Veränderung des Bauplans infolge der zunehmenden Anpasstheit an veränderte Umweltbedingungen, z. B. Blutkreisläufe der Wirbeltiere. Typisch für viele Entwicklungsreihen: zunehmende Kompliziertheit → Leistungsfähigkeit → Energiegewinn → Umweltunabhängigkeit → Überlebenschance → **Fitness**.
- E **Fitness** (Anpassungswert): Beitrag zur Häufigkeit der eigenen **Allele** in der nächsten Generation

6. Belege aus der Embryologie

LB 16; 15

- E **Gesetz der Embryonenähnlichkeit** (Carl Ernst von BAER, 1829): Die **Embryonen** (= frühe Entwicklungsstadien) von Wirbeltieren ähneln sich stark, auch wenn die erwachsenen Tiere dann sehr verschieden sind.
- E **Biogenetische Grundregel** (Ernst HAECKEL, 1866): Die Entwicklung eines Einzelwesens (**Individualentwicklung**, Ontogenese) ist eine geraffte und unvollständige Wiederholung der evolutionären Entwicklung (**Stammesentwicklung**, Phylogenese) seiner Art.
- trifft auf einzelne Merkmale zu, nicht auf alle Merkmale des Organismus in ihrer Gesamtheit
 - **Beispiele:** Kiementaschen bei allen Wirbeltierembryonen, Schwanzwirbelsäule bei Vogel- und Menschenembryonen
- E **Rudiment:** rückgebildetes – weil funktionslos gewordenes – Organ
Beispiele: Wurmfortsatz am Blinddarm des Menschen, Reste des Beckengürtels bei Walen
- E **Atavismus:** Auftreten von embryonal angelegten, dann im Laufe der normalen Embryonalentwicklung jedoch veränderten Merkmalen in ihrer stammesgeschichtlich ursprünglicheren Form
Beispiele: schwanzartig verlängertes Steißbein beim Menschen, mehrere Zehen beim Pferd

LB 15

7. Belege aus der Biochemie und Molekulargenetik: Protein- und DNA-Vergleiche

LB 17

W2 Struktur von Proteinen, Enzyme als Biokatalysatoren; Zellatmung S (K 2) 5/6; 11/12

W2/E **Proteinvergleiche:** Vergleich der **Aminosäuresequenz** funktionsgleicher **Proteine** bei verschiedenen Arten, z. B. Cytochrom c (Enzym aus der **Atmungskette**)

- **Hintergrund:**
 - jedes **Protein** durch spezifische Sequenz von **Aminosäuren** (AS) gekennzeichnet
 - AS-Sequenz durch **Basensequenz** im entsprechenden **Gen** der **DNA** codiert
 - **Genmutationen** führen zu Veränderung der Basensequenz → Veränderung der AS-Sequenz
 - Mutationen treten von Zeit zu Zeit spontan auf, dadurch werden sie zu „**molekularen Uhren**“: je länger der Zeitraum, desto mehr Mutationen, desto stärkere Veränderung der AS-Sequenz (Regel jedoch nicht für alle Proteinabschnitte gültig: **aktive Zentren** ändern sich kaum)
- **Auswertung:** Je größer die Unterschiede in der AS-Sequenz, vor desto längerer Zeit haben sich die untersuchten Arten stammesgeschichtlich voneinander getrennt; gibt es nur wenige oder gar keine Unterschiede, erfolgte die Aufspaltung in verschiedene Arten erst „vor Kurzem“ (= die Arten sind nahe verwandt).
- **Ergebnis:** **Stammbäume**, welche den Grad der Verwandtschaft der Arten aufzeigen

W2 Struktur der DNA, Proteinbiosynthese, Genmutationen, PCR S (K 2) 13–15

W2/E **DNA-Vergleiche:** Vergleich der **Basensequenz** sich entsprechender **DNA**-Abschnitte bei verschiedenen Arten

- **Hintergrund:**
 - Basensequenz der DNA enthält in den **Genen** den **Code** für die **Proteine** des Organismus
 - **Genmutationen** führen mit der Zeit zu immer stärkerer Änderung der Basensequenz („**molekulare Uhren**“)
- **Auswertung:** Je ähnlicher die Basensequenz, desto näher sind die untersuchten Arten miteinander verwandt.
- **Vorteil von DNA- gegenüber Proteinvergleichen:** aus evolutionsbiologischer Sicht noch deutlich aufschlussreicher. **Grund:** Die meisten AS können durch verschiedene **Basen-Triplets** codiert werden (**Degeneration** des genetischen Codes). Stimmen nun zwischen zwei Lebewesen nicht nur die AS-Sequenz des Proteins, sondern auch die entsprechende Basensequenz weitestgehend überein, kann eine **konvergente Entwicklung** dieses Proteins ausgeschlossen werden.

1. Methode: DNA-Hybridisierung

- **Hintergrund:** **DNA**-Molekül doppelsträngig; sich gegenüberliegende **komplementäre** Basen durch **Wasserstoffbrückenbindungen** (= schwache chemische Bindungen) verbunden
- **Durchführung und Auswertung:**
 - a) DNA der zu untersuchenden Arten gemeinsam erhitzen (**Schmelzen** der DNA): Wasserstoffbrückenbindungen lösen sich, DNA-Einzelstränge weichen auseinander
 - b) Abkühlen: Wasserstoffbrückenbindungen bilden sich wieder aus, DNA-Einzelstränge der verschiedenen Arten lagern sich – je nach der Menge der komplementären Basen – mehr oder weniger fest zusammen (**Hybridisierung** der DNA)
 - c) Ermittlung der zum erneuten Schmelzen nötigen Temperatur: je höher, desto mehr Wasserstoffbrückenbindungen (aufgrund größerer Zahl komplementärer Basen), desto größere Verwandtschaft

2. Methode: DNA-Sequenzierung

- biochemische Analyse der exakten Basensequenz eines DNA-Abschnittes
- Vergleich mit ebenfalls sequenzierten entsprechenden DNA-Abschnitten anderer Arten

8. Fossilien – Dokumente der Evolution

LB 8/9

E **Fossilien:** Überreste oder Spuren von Lebewesen vergangener Zeitalter
Beispiele für Fossilienformen: Versteinerungen, Abdrücke, Einschlüsse, Inkohlungen, Hartteile

- E **Erkenntnisse aus der Fossilienforschung**
1. Die meisten Fossilien weisen Ähnlichkeiten mit **rezenten** (heutigen) Lebewesen auf.
 2. Je älter die Fossilien sind, desto verschiedener sind sie von rezenten Lebewesen.
 3. Je älter die Fossilien sind, desto einfacher sind sie gebaut.
 4. Liegen viele Fossilien verwandter Arten vor, lassen sich **Entwicklungsreihen** feststellen.
 5. Merkmale, die einmal abgewandelt wurden, kommen nicht wieder in der ursprünglichen Form vor: evolutionäre Entwicklung ist nicht umkehrbar (Dollosche Regel).
 6. Die Fossilien vieler Arten finden sich nur in relativ begrenzten Epochen der Erdgeschichte.
 7. Fossilien der verschiedenen systematischen Gruppen von Lebewesen treten nicht alle gleichzeitig, sondern nacheinander auf.
 8. Fossile **Brückenformen** (Mosaikformen) weisen Merkmale älterer und jüngerer Gruppen gleichzeitig auf: Indizien für die allmähliche Herausbildung der Lebewesen aus gemeinsamen Vorfahren; *Beispiel:* Urvogel (Archaeopteryx) mit Merkmalen von Kriechtieren (Reptilien) und Vögeln.

9. Entwicklung des Evolutionsgedankens

LB 10/11

- E **Überzeugung von der Konstanz der Arten**
- unangefochten bis Ende des 18. Jahrhunderts (Grundlage: Schöpfungsbericht der Bibel)
 - erschüttert durch Erkenntnisse der **Paläontologie** (Fossilienkunde): **Fossilien** von Schicht zu Schicht unterschiedlich und nicht identisch mit **rezenten** Lebewesen
 - Versuch der Erklärung durch die **Katastrophentheorie** (Georges de **CUVIER**, um 1800): Von Zeit zu Zeit ereigneten sich auf der Welt Katastrophen, die alles Leben der betroffenen Region auslöschten. Anschließend wurde die Region durch Neuschöpfung und Zuwanderung wieder besiedelt.
 - Neuschöpfung nicht unbedingt direkt durch Gott; im passenden Milieu bilden sich Lebewesen durch „**Urzeugung**“ aus vorhandenen Stoffen auch von allein, z. B. Frösche im Schlamm
- E **Theorien zur Evolution der Arten**
- 1. Theorie von der Vererbung erworbener Eigenschaften** (Jean-Baptiste de **LAMARCK**, 1809)
 - ständiger Gebrauch bzw. Nichtgebrauch von Organen führt beim Individuum zu ihrer stärkeren Ausbildung bzw. Rückbildung
 - diese Veränderungen werden an die Nachkommen vererbt
 - allmähliche Veränderung der Arten im Laufe vieler Generationen
 - 2. Selektionstheorie** (Charles **DARWIN**, 1859)
 - Evolution erfolgt in **Populationen** (= Fortpflanzungsgemeinschaft der Organismen einer Art in einem bestimmten Gebiet)
 - alle Populationen weisen eine **Überproduktion an Nachkommen** auf; die zu deren Überleben notwendigen Ressourcen sind jedoch begrenzt → Notwendigkeit der **Selektion** (Auslese), d. h. nicht alle Nachkommen können überleben
 - Individuen einer Art zeigen **erbliche Variationen**, d. h. sie sind untereinander nicht völlig identisch, sondern unterscheiden sich in einzelnen Details, die sie als „Familienmerkmale“ auch weitervererben können
 - „**Kampf ums Dasein**“ (*struggle for life*) führt zum „**Überleben der Passendsten**“ (*survival of the fittest*): Individuen mit vorteilhafteren Merkmalen werden von der Umwelt seltener selektiert und können ihre Anlagen in stärkerem Maße an die nächste Generation weitergeben als Individuen mit weniger vorteilhaften Merkmalen: „**natürliche Auslese**“
 - allmähliche Veränderung der Arten im Laufe vieler Generationen

Mechanismen der Evolution

Kenntnisse	Fertigkeiten
<ul style="list-style-type: none"> • Erklärung der Entstehung der Biodiversität gemäß der erweiterten (= synthetischen) Evolutionstheorie • Zusammenwirken der Evolutionsfaktoren: Mutation, Rekombination, Selektion, Isolation • Spezialfälle: sexuelle Selektion, Gendrift, adaptive Radiation, Koevolution 	<ul style="list-style-type: none"> • Erläutern der Wirkung der Evolutionsfaktoren auf Populationen • Erklärung der Entstehung neuer Arten anhand der erweiterten Evolutionstheorie

1. Übersicht über die Evolutionsfaktoren im Sinne der erweiterten Evolutionstheorie

LB 26/27

- W3 Selektionstheorie (DARWIN) S 8
- E **Erweiterte (= Synthetische) Evolutionstheorie**
- derzeit gültige Theorie zur Evolution der Lebewesen
 - Grundlage: DARWIN'S **Selektionstheorie**; ergänzt v. a. durch Erkenntnisse der Genetik, **Ökologie** (Lehre vom Zusammenleben der Organismen in Lebensräumen), **Ethologie** (Verhaltenslehre)
- E **Evolutionsfaktoren**
- 1. Mutationen und Rekombinationen**: spontan und zufällig; Ursachen der **erblichen Variabilität** der Individuen einer **Population**
 - 2. Selektion**: Umwelteinflüsse, die der Evolution eine Richtung geben, indem sie die **Fitness** bestimmter **Varianten** steigern und die anderer Varianten senken
 - 3. Isolation**: Trennung von **Populationen**, d. h. Unterbindung des Genaustauschs; Voraussetzung für die Aufspaltung der **Arten** und damit für die Herausbildung der **Biodiversität**

2. Mutationen und Rekombinationen		LB 28/29
W2	Genmutationen; genetische Variabilität durch Rekombination	S (K 2) 15; 17
E	Variabilität: Individuen einer Population stimmen nicht in allen Merkmalen überein; die Ursachen dafür können erblich (Mutationen/Rekombinationen) oder nicht erblich (Modifikationen) sein	
E	Modifikationen – durch Umwelteinflüsse bewirkte Verschiedenheit des Phänotyps artgleicher Organismen, z. B. mehr oder weniger kräftiger Wuchs von Pflanzen je nach Mineralstoffgehalt des Bodens – keine Veränderung der Gene → nicht erblich → ohne Bedeutung für die Evolution	
W2	Mutationen – spontane und zufällige Veränderungen des genetischen Materials → Vergrößerung des Genpools (= Gesamtheit der Gene einer Population) durch die Schaffung neuer Allele	
W2	Rekombinationen → Umschichtung des Genpools – bei der Bildung von Keimzellen (meiotische Zellteilung): • intrachromosomal: zufälliges Crossing-over mit Stück austausch in der Prophase I • interchromosomal: zufällige Verteilung der homologen Chromosomen in der Anaphase I – bei der Befruchtung: zufällige Kombination von je einer der verschiedenen Ei- und Samenzellen	
3. Selektion		LB 30–33
W3/E	Prinzip der Selektion – Voraussetzungen: Überproduktion an Nachkommen ; Variabilität unter den Individuen einer Population – Methode: Bevorzugung bzw. Benachteiligung der verschiedenen Varianten von Individuen durch abiotische und biotische Umwelteinflüsse (= Selektionsfaktoren) → bevorteilte Individuen haben bessere Chancen, sich fortzupflanzen und ihre Allele weiterzugeben = höhere Fitness – Wirkung: Selektionsdruck → Allelhäufigkeiten im Genpool einer Population verschieben sich im Laufe von Generationen in eine bestimmte Richtung	LB 30
E	Selektionsfaktoren	LB 32
	a) abiotische Faktoren: Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Bodenverhältnisse, Lichtverhältnisse, Jahreszeitenrhythmus, Eiszeiten, ...	LB 63
	b) biotische Faktoren: – interspezifisch (zwischenartlich): Fressfeinde , Parasiten , Symbionten , ... – intraspezifisch (innerartlich): Konkurrenten um Nahrung, Wohnraum, soziale Stellung, Geschlechtspartner, ... • Parasitismus: Lebensgemeinschaft von Individuen verschiedener Arten , bei denen der Parasit den Wirt schädigt (z. B. Bandwurm und Mensch, Floh und Hund) • Symbiose: Lebensgemeinschaft von Individuen verschiedener Arten zu gegenseitigem Vorteil (z. B. Flechten = Pilz und Grünalge, Einsiedlerkrebs und Seeanemone)	LB 63
	c) Mensch als Selektionsfaktor: – durch Veränderung der Umwelt: Düngung, Abgase, Abwässer, Herbizide , Insektizide , Antibiotika , Verstädterung (Straßen- und Wohnungsbau), Monokulturen (Land- und Forstwirtschaft), Import von Lebewesen anderer Regionen (Neobiota: Neophyta/Neozoa), ... – durch gezielte Auswahl von Lebewesen, die zur Fortpflanzung zugelassen werden (= Züchtung), weil sie Merkmale aufweisen, die dem angestrebten Züchtungsziel entgegenkommen: „ künstliche Auslese “, z. B. Haustiere, Nutz- und Zierpflanzen, ...	LB 33; 71–75
E	Formen der Selektionswirkung	LB 31
	a) stabilisierende Selektion: Varianten werden umso stärker selektiert, je weiter ihre Merkmale in irgendeiner Richtung vom Durchschnitt abweichen → verhindert Wandel → relative Konstanz der Arten	
	b) gerichtete Selektion: Varianten werden umso stärker selektiert, je weiter ihre Merkmale in einer bestimmten Richtung vom Durchschnitt abweichen → Fitness-Steigerung der Varianten der gegenüberliegenden Richtung → allmähliche Umwandlung der Art in Richtung auf die fitteren Varianten	
	c) disruptive (aufspaltende) Selektion: Varianten werden umso stärker selektiert, je mehr ihre Merkmale dem bisherigen Durchschnitt entsprechen → Fitness-Steigerung der Varianten, die in beiden Richtungen außerhalb des Durchschnitts liegen → allmählicher Wandel in zwei gegensätzliche Formen → Auftrennung der ursprünglichen Population

- E **Strategien zur Verringerung der Selektion durch biotische Faktoren**
- interspezifisch: Verringerung der Selektion durch Fressfeinde LB 32
 - **Mimese**: Tarnung durch Nachahmung von Formen und Farben der Umgebung, z. B. Stabheuschrecken, Wandelndes Blatt
 - **Mimikry**: Nachahmung wehrhafter oder giftiger Tiere (Scheinwartracht), z. B. Schwebfliegen; *Voraussetzungen*: Lernvermögen des Fressfeinds, Zahl der Nachahmer deutlich geringer als Zahl der Vorbilder
 - intraspezifisch: Verringerung der Konkurrenz durch Artgenossen LB 34
 - **Einnischung** (= Wahl einer eigenen **ökologischen Nische**): Spezialisierung auf bestimmte Nahrung, Wohnräume, Aktivitätszeiten usw., die sich von denen der Artgenossen unterscheiden
- E **Spezialfall: Sexuelle Selektion** LB 33
- **Selektionsfaktor** = auswählender Geschlechtspartner
 - erfolgreiche Partnerfindung → Fortpflanzungserfolg → **Fitness-Maximierung**
 - Erfolg des Ausgewählterwählens abhängig von der „Attraktivität“, d. h. von körperlichen Merkmalen, die als **Schlüsselreize** (Auslöser) für die Paarungsbereitschaft des Wählenden wirken
 - Ausbildung attraktiver Merkmale zumeist mit Nachteilen verbunden: erhöhter Energieaufwand, Behinderung bei der Bewegung, Wecken der Aufmerksamkeit von Fressfeinden, ...
 - Merkmale, die zur maximalen Fitness führen, deshalb eine „Kompromisslösung“: so attraktiv wie möglich, aber so „alltagstauglich“ wie nötig
 - **Sexualdimorphismus**: unterschiedliches Erscheinungsbild der beiden Geschlechter einer Art; oft Folge der sexuellen Selektion

4. Isolation LB 34–38

- W3/E – Unterbindung der Fortpflanzung (= des Genaustauschs) zwischen Individuen einer **Art**
- Voraussetzung für die Aufspaltung der Art in Rassen und neue Arten
- E **Reproduktive Isolation**
- Individuen einer Ursprungsart sind reproduktiv isoliert, wenn sie sich miteinander nicht mehr fortpflanzen können; es sind nun zwei verschiedene **Arten** (**biologischer Artbegriff**).
 - *mögliche Gründe*: verschiedene Aktivitätszeiten, verschiedene Muster des Fortpflanzungsverhaltens, genetische Inkompatibilität (z. B. verschiedene Chromosomenzahl), zu starke Größenunterschiede usw.
 - *hauptsächliche Ursachen*: **geographische** oder **ökologische Isolation**
- E **Geographische Isolation (Separation)** LB 34; 37
- Verlust des Zugangs einer Teil**population** zur Restpopulation, z. B. durch Inselbildung → Unterbrechung des Genaustauschs zwischen den Teilpopulationen → getrennte Weiterentwicklung der beiden **Genpoole** → Möglichkeit der Herausbildung **reproduktiver Isolation**
 - Entstehung verschiedener **Arten** in räumlich getrennten Gebieten: **allopatriische Artbildung**
- E **Ökologische Isolation (Einnischung)** LB 34/35; 37
- Teilpopulationen besetzen verschiedene **ökologische Nischen**, z. B. verschiedene Etagen ein und desselben Baumes, verschiedene Aktivitätszeiten → Unterbrechung des Genaustauschs zwischen den Teilpopulationen → getrennte Weiterentwicklung der beiden **Genpoole** → Möglichkeit der Herausbildung **reproduktiver Isolation**
 - Entstehung verschiedener **Arten** im gleichen Gebiet: **sympatriische Artbildung**
 - *Spezialfall*: **adaptive Radiation**, z. B. Darwinfinken auf Galapagos: Neubesiedlung eines Territoriums mit vielen ökologischen Möglichkeiten und kaum Feinden → Besetzung der verschiedenen **ökologischen Nischen** zur Verringerung der **Konkurrenz** → Aufspaltung der Ursprungsart in viele verschiedene Arten innerhalb relativ kurzer Zeit LB 34; 38
- W3/E *Spezialfall*: **Gendrift** LB 36
- Änderungen in den **Allelhäufigkeiten** im **Genpool**, die durch rein zufällige Ereignisse, also *nicht* durch **Selektion** bewirkt werden
 - Wirkung umso stärker, je kleiner die **Population** ist
 - *Folge*: **Allele**, die von der **Selektion** eigentlich benachteiligt werden, treten in großer Menge auf, weil die eigentlich bevorteilten **Allele** in der entsprechenden **Population** nicht vorkommen
 - *Formen*:
 - a) **Flaschenhalseffekt**: drastische Dezimierung einer ursprünglich großen **Population** durch einschneidende Ereignisse, z. B. Überschwemmungen, Bejagung → **Allele** der wenigen überlebenden Individuen bilden die Grundlage für den Neuaufbau der **Population**
 - b) **Gründereffekt**: Abtrennung weniger Individuen von einer großen **Population**, z. B. durch Auswanderung oder Verschleppung (z. B. auch **Neobiota**) → **Allele** der wenigen isolierten Individuen bilden die Grundlage für den Neuaufbau der **Population**

5. Spezialfall: Koevolution

LB 46/47

- W3
- **Koevolution:** Evolutionsvorgang, bei dem zwei **Arten** wechselseitig aufeinander einen **Selektionsdruck** ausüben, sodass sich ihre gegenseitige Angepasstheit immer weiter verstärkt
 - **Beispiele:** Blüten und ihre Bestäuber, **Parasiten** und ihre **Wirte**, **Symbionten**
 - **Vorteil:** **Fitness-Maximierung** für beide Arten; **Nachteil:** Abhängigkeit der Arten voneinander

Die Geschichte des Lebens auf der Erde

Kenntnisse

- wichtige Etappen der Stammesgeschichte der Lebewesen
- Entstehung des Lebens aus nichtlebender Materie; Entwicklung von Zellen; Prokaryoten und Eukaryoten; Einzeller und Vielzeller
- Massenaussterben und Evolutionsschübe
- Stellung des Menschen im System der Organismen und Evolution des Menschen

Fertigkeiten

- Beschreiben wichtiger Bedingungen und Etappen bei der Herausbildung des Lebens auf der Erde
- Erläutern des Zusammenhangs zwischen Massenaussterben und Evolutionsschüben
- Einordnen des Menschen in das natürliche System der Organismen und Begründen seiner Sonderstellung
- Vergleichen von Mensch und Menschenaffe
- Beschreiben wichtiger Etappen der Evolution des Menschen

1. Ein Gang durch die Erdzeitalter – die Stammesgeschichte der Lebewesen

LB 44/45

- E **Erdfrühzeit** (ab ca. 4,5 Mrd. Jahren)
- **chemische Evolution** (Entstehung von wichtigen Biomolekülen, Replikationsmechanismen und Möglichkeiten der **Kompartimentierung**) → Entstehung des Lebens → **biologische Evolution**
 - „Erfindung“ der **Photosynthese** → Freisetzung ungebundenen Sauerstoffs in die Atmosphäre
 - Wasser als einziger Lebensraum
- E **Erdaltertum** (ab ca. 550 Mio. Jahren)
- Entwicklung vielfältigen Lebens im Wasser (Trilobiten, Algen)
 - 1. **Massenaussterben** (vor ca. 440 Mio. Jahren)
 - Erstbesiedlung des Festlands durch Pflanzen
 - 2. Massenaussterben (vor ca. 360 Mio. Jahren)
 - riesige Wälder aus Farnen und Schachtelhalmen → starke Sauerstoffproduktion und Produktion von Biomasse
 - Entwicklung von Insekten, Fischen, Lurchen und Kriechtieren → Besiedlung des Festlands durch Tiere
 - 3. Massenaussterben (vor ca. 250 Mio. Jahren)
- E **Erdmittelalter** (ab ca. 250 Mio. Jahren)
- Entwicklung der nacktsamigen Pflanzen
 - 4. Massenaussterben (vor ca. 200 Mio. Jahren)
 - Blütezeit der Kriechtiere (Saurier); Entwicklung von Vögeln und Säugetieren
 - Entwicklung der bedecktsamigen Pflanzen
 - 5. Massenaussterben (vor ca. 70 Mio. Jahren)
- E **Erdneuzeit** (ab ca. 70 Mio. Jahren)
- Blütezeit der Säugetiere
 - Entwicklung der ersten **Primaten** → Evolution des Menschen → **kulturelle Evolution**
 - Eiszeit
 - Herausbildung der heutigen Tier- und Pflanzenwelt

2. Chemische Evolution

LB 41/42

- E **Voraussetzungen für die Entstehung von Leben**
- wichtige Biomoleküle: **Kohlenhydrate**, **Lipide** (Fette), **Proteine**, **Nucleinsäuren** S (K 2) 3; 5/6; 13
 - Möglichkeit zur **Kompartimentierung** S (K 2) 3
 - Mechanismen zur selbstständigen **Replikation** der Biomoleküle S (K 2) 13
- E **Hypothetischer Ablauf der chemischen Evolution**
- Bildung von Grundbausteinen (**Monomeren**) der Biomoleküle aus anorganischen Verbindungen unter den Bedingungen der frühen Erde:
 - Atmosphäre: Wasserdampf, CO₂, Methan (CH₄), Ammoniak (NH₃), Schwefelwasserstoff (H₂S)
 - Urozean („**Ursuppe**“): kondensierte Atmosphäre → Wasser mit gelösten Stoffen
 - Energielieferanten: hohe Temperatur der Erde selbst; kosmische UV-Strahlung

- Aufbau der Biomoleküle aus ihren **Monomeren (Polymerisation)**: Bildung von **Proteinen, Lipiden, Kohlenhydraten, Nucleinsäuren (RNA, DNA)**
- Zusammenlagerung von **Lipiden** durch **self assembly** → Bildung von **Kompartimenten**
- Einschluss von **Nucleinsäuren** und **Proteinen** in **Kompartimenten** → erste Stoffwechselreaktionen, die u. a. die Selbst**replikation** der Nucleinsäuren und Proteine ermöglichten (**Hyperzyklus**)
- **Ergebnis**: Herausbildung eines membranbegrenzten **Kompartiments**, das in der Lage ist, sich selbst zu erhalten und zu vervielfachen (**Protobiont**, „Urzelle“)

E Experimentelle Belege für die Hypothese der chemischen Evolution

- Stanley MILLER (1953): Unter den im Labor nachgestellten Bedingungen der frühen Erde bilden sich aus anorganischen Stoffen viele wichtige Biomoleküle, u. a. **Kohlenhydrate, Lipide**, alle 20 **Aminosäuren**, die Basen der **Nucleinsäuren, ADP** und **ATP**.
- Sidney W. FOX (1957): Nachweis, dass **Aminosäuren** durch Erwärmung selbstständig zu **Proteinen** polymerisieren können und dass Proteine sich durch **self assembly** zu kugelförmigen Gebilden zusammenlagern können (**Mikrosphären**), die sich durch das Abschnüren kleinerer Mikrosphären vervielfachen können

3. Biologische Evolution der Zelle LB 43

W2 Grundbegriffe zum Stoffwechsel S (K 2) 7/8

E Heterotrophie und Autotrophie

- zunächst **heterotrophe** Ernährungsweise (Ernährung von den organischen Verbindungen der **Ursuppe**) der **Protobionten** und **Prokaryoten** unter **anaeroben** Bedingungen (**Gärung**)
- nach Verknappung der Nahrungsgrundlage Entwicklung der Strukturen, die für eine **autotrophe** Ernährungsweise (**Chemo- und Photosynthese**) benötigt werden → Bildung der ersten autotrophen **Prokaryoten** → Freisetzung molekularen Sauerstoffs → erste Prokaryoten mit **aerober Dissimilation (Zellatmung)**

W2 Endozytose, Zellbestandteile, Pro- und Eukaryoten, Endosymbiontentheorie S (K 2) 4/5

W2/E Von den Prokaryoten zu den Eukaryoten: Endosymbiontentheorie

- **Endozytose** anderer Zellen:
 - Aufnahme **autotropher Prokaryoten** → **Chloroplasten**
 - Aufnahme **heterotropher Prokaryoten** → **Mitochondrien**
- Belege: Bakteriengröße, Doppelmembran, **Ribosomengröße**, eigene **DNA**, Prokaryoten**proteine**
- Einstülpungen der Zellmembran, die sich als **Vesikel** ablösen, bilden **Kompartimente** innerhalb der Zelle: **Zellkern, ER, Golgi-Apparat** usw.

E Von Einzellern zu Vielzellern

- gleichartige **Einzelner** lagern sich zu **Zellkolonien** zusammen → **Differenzierung** der Zellen (Funktionsteilung mit damit einhergehender Strukturdiversität) → echte **Vielzeller**
- **Beispiel**: einzellige Grünalge (Chlorella) → Zellkolonie (Pandorina) → vielzellige Alge (Volvox)

4. Evolutionsschübe nach Massenaussterben LB 44/45

- fünf globale **Massenaussterben**
- Ursachen sind z. B. Meteoriteneinschläge/Vulkanausbrüche → Verdunklung/Abkühlung; Klimaschwankungen → Verwüstung/Vergletscherung → Anstieg/Absinken des Meeresspiegels
- **Folge**: Aussterben großer Teile von Flora und Fauna mit anschließender Neubesiedlung der Lebensräume → Herausbildung einer großen Vielfalt neuer Arten (**Evolutionsschub**) durch die Möglichkeit zur **adaptiven Radiation**

5. Evolution des Menschen (I) – Einordnung des Menschen in das System der Organismen LB 50; 52

E	systematische Kategorie	Kriterien bzw. zugehörige Arten
	Reich	Tiere
	Stamm	Wirbeltiere
	Klasse	Säugetiere
	Ordnung	Primaten („Herrentiere“)
	Familie	Menschenaffen (Hominidae)
	Gattung	Menschen (Homo)
	Art	Mensch (Homo sapiens)
		Bau der Zellen
		knöchernes Innenskelett
		Säugen der Nachkommen, Haarkleid, gleichwarm
		nach vorn gerichtete Augen, Greifhände und -füße ohne Krallen, geringe Nachkommenzahl, lange Kindheit/Jugend, stark entwickeltes Großhirn
		Menschenaffen (Orang-Utan, Gorilla, Schimpanse, Bonobo) und Mensch
		rezenter Mensch und fossile Vorfahren sowie Neandertaler
		einzigste rezente Art der Gattung Homo

6. Evolution des Menschen (II) – Vergleich von Mensch und Menschenaffen LB 54/55

- E Anatomische Merkmale**
Gemeinsamkeiten:
- breiter Brustkorb mit breiter Schulter (→ große Beweglichkeit der Arme)
 - rudimentärer Schwanz (→ Steißbein)
 - gleiche Zahnformel
- Unterschiede:* zumeist einhergehend mit dem aufrechten Gang (**Bipedie**) beim Menschen
	Mensch	Menschenaffe
• Wirbelsäule	doppelt S-förmig	C-förmig
• Becken	breit, schüsselförmig	flach, brettförmig
• Füße	flach, „Standfuß“	gewölbt, „Greiffuß“
• Hände	Daumen kann jedem Finger gegenübergestellt werden: „Präzisionsgriff“	Daumen kann den übrigen Fingern nur insgesamt gegenübergestellt werden: „Faustgriff“
• Schädel		
– Hinterhauptsloch	zentral	im hinteren Schädelbereich
– Hirnschädel	deutlich größer als Gesichtschädel	deutlich kleiner als Gesichtschädel
– Kiefer	parabelförmig, Zahnreihe geschlossen	U-förmig, Zahnreihe mit „Affenlücke“
– Überaugenwülste	fehlen	deutlich ausgeprägt
- E Chromosomale Merkmale**
Gemeinsamkeiten: weitgehende Übereinstimmung in Form, Größe und Bandenmuster
Unterschied: Menschenaffen 48, Menschen 46 **Chromosomen** (Fusion zweier Chromosomen)
- E Molekulare Merkmale**
Gemeinsamkeiten: weitgehende Übereinstimmung in der **Basensequenz** der **DNA**; große Ähnlichkeit in der **Aminosäuresequenz** vieler **Proteine**
Unterschiede: Aktivitätsmuster der Gene; Detailbau der Proteine

7. Evolution des Menschen (III) – Schlüsselereignisse in der Evolution des Menschen

- E Entwicklung des aufrechten Ganges (Bipedie)** LB 56
- vor ca. 35 Mio. Jahren: gemeinsame Vorfahren von Menschenaffen und Menschen: Baumbewohner in Regenwäldern Afrikas, z. B. Aegyptopithecus
 - vor ca. 6 Mio. Jahren: zunehmende Trockenheit und Abkühlung → Rückgang der Regenwälder, Ausbildung von Savannen → Selektionsvorteile durch aufrechten Gang (besserer Überblick, Hände frei zum Tragen/Sammeln)
 - anatomische Veränderungen, die mit der **Bipedie** einhergehen: Verlagerung des Körperschwerpunkts nach oberhalb des Beckens; Umformung des Beckens zur Schüsselform; Verlagerung des Hinterhauptsloches nach unterhalb des Schädelsschwerpunkts; Wegfall der starken Nackenmuskulatur
 - vor ca. 4 Mio. Jahren: **Australopithecus** („Lucy“) mit ständig aufrechtem Gang und zahlreichen Merkmalen, die Zwischenstufen zwischen dem Körperbau von Menschenaffen und Mensch darstellen: „**Tier-Mensch-Übergangsphase**“ (TMÜ)
- E Entwicklung von Hirnvolumen und Kultur** LB 56
- Vergrößerung des Hirnvolumens von 400 ml (**Australopithecus**) auf 1700 ml (**Homo sapiens**)
 - zunehmende Umweltunabhängigkeit durch den Gebrauch von Werkzeugen, Feuer, Behausungen, Kleidung mit damit einhergehender Veränderung körperlicher Merkmale: Herausbildung der zum Präzisionsgriff befähigten Hand, Rückgang der Körperbehaarung
 - Entwicklung von Sprache, Schrift und Kunst als Folge der Herausbildung sozialer Strukturen: **kulturelle Evolution** (seit ca. 300 000 Jahren)
- W3 Theorie von der Vererbung erworbener Eigenschaften (LAMARCK)** S 8
- E Kulturelle Evolution** LB 51
- verläuft mit großer Ähnlichkeit zur Theorie von der Vererbung erworbener Eigenschaften: gemachte Erfahrungen, erworbene Kenntnisse und Techniken können an andere Individuen weitergegeben werden (**Traditionsbildung**); *wichtiger Unterschied:* Weitergabe erfolgt nicht nur von Generation zu Generation, sondern in alle Richtungen
 - **Kulturgut:** Gesamtheit aller Kenntnisse und Fähigkeiten
 - erste Steinwerkzeuge (**Australopithecus**) → bearbeitete Steinwerkzeuge → **Faustkeile**
 - Nutzung des Feuers (**Homo erectus**, „Urmensch“, ca. 500 000 Jahre)
 - erste Kunstwerke (Höhlenmalereien, Statuetten; **Homo sapiens**, ca. 30 000 Jahre)

- Tier- und Pflanzenzucht, Siedlungen (ca. 10 000 Jahre)
- erste Schrift (Keilschrift, ca. 3000 Jahre) → Buchstabenschrift → Buchdruck (GUTENBERG, 1445) → Photokopie (1938)
- Computer (ZUSE, 1941) → Internet (1989)
- wichtigstes Medium zur **Tradierung** von Kulturgütern: Sprache, Schrift

Genetisch bedingtes Verhalten

Kenntnisse

- proximate und ultimate Ursachen von Verhalten
- unbedingter Reflex: Kennzeichen, Ablauf, Beispiele
- Instinkthandlung: Kennzeichen, Ablauf, Beispiele
- Attrappenversuche, Kaspar-Hauser-Versuche

Fertigkeiten

- Beschreiben des Ablaufs von unbedingten Reflexen und Instinkthandlungen
- Analysieren von konkreten Verhaltensmustern unter Einbeziehung der ethologischen Fachsprache
- Interpretieren grafischer Darstellungen ethologischer Beobachtungsergebnisse

1. Grundlagen

- E **Verhalten** LB 82
- Gesamtheit der Aktivitäten von Tier/Mensch
 - besitzt **genetisch bedingte** („angeborene“) und **erfahrungsbedingte** („erlernte“) Anteile → Ergebnis des Zusammenwirkens von Erbinformationen und Umwelteinflüssen
 - **Verhaltensbiologie** = **Ethologie**
- E **Ursachen des Verhaltens** LB 83
1. **proximate Ursachen**: „Wodurch wird ein bestimmtes Verhalten im konkreten Fall ausgelöst und wie kommt es zustande?“ (**Hormone**, **Schlüsselreize**, Ergebnisse eines Lernvorgangs, ...)
 2. **ultimate Ursachen**: „Welchen Einfluss hat ein bestimmtes Verhalten auf die **Fitness** des Tieres?“ (biologischer Sinn des Verhaltens aus evolutionärer Sicht)
- E **Methode der Erkenntnisgewinnung in der Ethologie** LB 84/85
- Beobachtung → Beschreibung → Hypothese → Versuch → Messung → Auswertung → Analyse

2. Unbedingter Reflex (Erbkoordination)

LB 86

- W2 Aktionspotenzial, Erregungsleitung, Synapse S (K 2) 23/24
- E **Kennzeichen eines unbedingten Reflexes**
- **unbedingt** = nicht erlernt = „angeboren“ (**genetisch bedingt**)
 - einfache Reaktion auf einen **überschwelligem Reiz**
 - schnell, unwillkürlich, immer in derselben Weise (**formstarr**), beliebig oft wiederholbar
 - **Beispiele**: Kniesehnenreflex, Lidschlussreflex, Saugreflex beim Neugeborenen, ...
 - **ultimate Ursache**: Schutz des Körpers vor Gefahren, Erhaltung des Lebens
- E **Ablauf („Reflexbogen“)**
- Reiz** → **Rezeptor** (Sinneszelle): Umwandlung des **Reizes** in eine **Erregung** → **afferente Nervenbahn**: Erregungsleitung → **Zentrales Nervensystem (ZNS** = Gehirn/Rückenmark): Verarbeitung der Erregung und Aussendung einer neuen → **efferente Nervenbahn**: Erregungsleitung → **Effektor** (Muskel/Drüse) → **Reaktion**

3. Prinzip der doppelten Quantifizierung

LB 88

- E
- **doppelte Quantifizierung**: Eine **Reaktion** ist sowohl von (äußeren) **Reizen** als auch von (innerer) **Handlungsbereitschaft** (Motivation, Antrieb) abhängig.
 - **Handlungsbereitschaft** wird beeinflusst von inneren Zuständen (z. B. Hunger), Biorhythmus (Tages-/Jahreszeitenrhythmus), vorausgegangenem Verhalten, ...
 - Verrechnung der Qualität des **Reizes** mit der Höhe der **Handlungsbereitschaft** im **Koinzidenzglied** (neuronale Struktur im **ZNS**): **Reaktion** erfolgt nur, wenn die Summe beider Faktoren einen bestimmten Wert überschreitet

4. Instinkthandlung (komplexe Erbkoordination)

LB 88/89

- E **Kennzeichen einer Instinkthandlung**
- läuft unter gleichen Bedingungen stets in gleicher Weise ab
 - unterliegt der **doppelten Quantifizierung**
 - eigentliche **Reaktion** (= **Endhandlung**) abhängig vom Vorhandensein eines **Schlüsselreizes**
 - **AAM (angeborener Auslösemechanismus)**: neuronale Struktur im **ZNS**, in der die Eigenschaften des **Schlüsselreizes** angeborenerweise gespeichert sind

- E **Ablauf**
 Handlungsbereitschaft → ungerichtete Appetenz (Suchverhalten) → adäquater Reiz → Verrechnung mit der Handlungsbereitschaft → gerichtete Appetenz (Taxis) → Schlüsselreiz (erkannt vom AAM) → Verrechnung mit der Handlungsbereitschaft → Endhandlung → verringerte Handlungsbereitschaft (Einzelne Schritte können im konkreten Fall fehlen, z. B. die Taxis.)
- E **Instinkt-Lern-Verschränkung:** grundsätzlicher Ablauf der Enhandlung zwar genetisch bedingt, Effektivität des konkreten Bewegungsablaufes jedoch durch Erfahrung (Lernen) gesteigert

5. Attrappenversuche und Kaspar-Hauser-Versuche

LB 90/91

- E **Attrappenversuche**
- Ziel: Bestimmung der im AAM gespeicherten Eigenschaften eines Schlüsselreizes
 - Attrappe: künstliches Reizbild, das dem natürlichen Reiz mehr oder weniger stark ähnelt
 - Vorgehen: Beobachtung der Reaktionen des Tieres bei Konfrontation mit den verschiedenen Attrappen (ausgehend von möglichst naturgetreuem Reizbild wird die Attrappe schrittweise immer stärker schematisiert) → Auswertung des Beobachtungsergebnisses
 - Probleme
- E **Kaspar-Hauser-Versuche**
- Ziel: Bestimmung des Ausmaßes des genetisch bedingten Verhaltensanteils
 - Vorgehen: Aufzucht von Tieren in vollständiger Isolation (ohne Artgenossen, ohne andere Lerngelegenheiten) → Beobachten des Verhaltensrepertoires dieser Kaspar-Hauser-Tiere → Auswertung der Beobachtungsergebnisse
 - Probleme

6. Überwiegend genetisch bedingtes Verhalten beim Menschen

LB 120/121

- E **Kindchenschema**
 Körperformen von Kleintieren/Babys lösen Zuwendung und Fürsorge aus: großer Kopf, große Augen, Stupsnase, kleiner Mund, rundliche Körperformen
- E **Mann-Frau-Schema**
 Körperformen fördern beim kompatiblen Partner Sympathie, Annäherung, Paarbindung
- Frau: volle Lippen, Brüste, schmale Schultern, breites Becken, gerundete Formen
 - Mann: breite Schultern, schmales Becken, Behaarung, kräftige Muskulatur, kantige Formen

Erfahrungsbedingtes Verhalten

Kenntnisse

- Prägung, prägungsähnliche Vorgänge beim Menschen
- Konditionierungen: reiz- und verhaltensbedingte Konditionierung

Fertigkeiten

- Analysieren von konkreten Verhaltensmustern unter Einbeziehung der ethologischen Fachsprache

1. Prägung

LB 92–94

- E **Kennzeichen einer Prägung**
- Lernprozess, der nur innerhalb einer relativ kurzen Zeitspanne (sensible Phase) möglich ist
 - erlernte Inhalte dauerhaft gespeichert: Prägungen sind irreversibel, aber löschar
 - Lerninhalte = Eigenschaften eines bestimmten Objekts („Objektfixierung“), z. B.
 - Nachfolgeprägung: Mutter/Eltern
 - sexuelle Prägung: Geschlechtspartner
 - Wirtsprägung: Wirt (bei Parasiten)
- E **Nachfolgeprägung** (Konrad LORENZ) LB 92
- Lerninhalt: Aussehen und Verhalten der Mutter/Eltern
 - bedeutsam vor allem für Nestflüchter, z. B. Gänse
 - Löschung bei Beginn der Geschlechtsreife
- E **Prägungsähnliche Vorgänge beim Menschen: Mutter-Kind-Bindung** LB 94
- sensible Phase: 2. bis 24. Monat
 - Lerninhalt: Aussehen und Verhalten der Eltern
 - Folge: Zuwendung gegenüber Eltern, Aufbau des Urvertrauens
 - ultimate Ursachen
- Hospitalismus:** Verhaltensstörungen als Folge fehlender Mutter-Kind-Bindung
 fehlendes Urvertrauen → Unsicherheit/Angst → fehlende Neugier → fehlende Lernmöglichkeiten
 → Misserfolge → steigende Unsicherheit/Angst ...

2. Konditionierung (I): reizbedingte Konditionierung

LB 95

- E **Kennzeichen der reizbedingten** (klassischen) **Konditionierung**
- Ein ursprünglich **neutraler Reiz** wird durch einen Lernvorgang (**Konditionierung**) zu einem **bedingten Reiz**, d. h. zum Auslöser eines bestimmten Verhaltens (reversibler Lernvorgang).
 - **Kontiguität**: zeitgleiches Auftreten von **neutralem** und **unbedingtem Reiz**
 - **ultimate Ursachen**
- W3 unbedingter Reflex S 14
- E a) **bedingter Reflex**
- **bedingter Reiz** löst eine **Reflexreaktion** aus
 - **Beispiel**: Speichelfluss beim Hund nach einem Ton-/Lichtsignal (Iwan PAWLOW)
 - Verlauf:
 - wiederholtes, zeitgleiches Auftreten (**Kontiguität**) eines **unbedingten Reizes** (Futter) und eines **neutralen Reizes** (Ton/Licht) → **Reflexreaktion** (Speichelfluss)
 - Lernvorgang: Verknüpfung von **unbedingtem** und **neutralem Reiz** (**Konditionierung**) → Umwandlung des neutralen in einen **bedingten Reiz**
 - Ergebnis: Auftreten des **bedingten Reizes** allein genügt zum Auslösen der **Reflexreaktion**
- E b) **bedingte Appetenz** („Lernen aus guter Erfahrung“)
- **bedingter Reiz** löst ein gezieltes Zuwenden zur bzw. Aufsuchen der Reizsituation aus (**Appetenz**)
 - **Beispiel**: Aquariumsfische erwarten immer wieder an derselben Stelle ihr Futter
 - wichtige Unterschiede zum **bedingten Reflex**: **doppelte Quantifizierung**, nicht **formstarr**
 - Verlauf:
 - wiederholtes, zeitgleiches Auftreten (**Kontiguität**) einer **neutralen Reizsituation** (Gegebenheiten des jeweiligen Ortes) und einer positiven Erfahrung (Möglichkeit zum Fressen)
 - Lernvorgang: Verknüpfung von **neutraler Reizsituation** und positiver Erfahrung (**Konditionierung**) → Umwandlung der neutralen in eine **bedingte Reizsituation**
 - Ergebnis: aktives Aufsuchen der **bedingten Reizsituation** bei entsprechender **innerer Handlungsbereitschaft**
- E c) **bedingte Aversion** („Lernen aus schlechter Erfahrung“)
- **bedingter Reiz** löst ein Meide-/Fluchtverhalten gegenüber der Reizsituation aus (**Aversion**)
 - **Beispiel**: Katze jagt nicht mehr nach Bienen/Wespen
 - Verlauf:
 - wiederholtes, zeitgleiches Auftreten (**Kontiguität**) einer **neutralen Reizsituation** (Färbung der Biene) und einer negativen Erfahrung (Schmerz nach Stich durch eine Biene)
 - Lernvorgang: Verknüpfung von **neutraler Reizsituation** und negativer Erfahrung (**Konditionierung**) → Umwandlung der neutralen in eine **bedingte Reizsituation**
 - Ergebnis: Vermeiden der **bedingten Reizsituation**

3. Konditionierung (II): verhaltensbedingte Konditionierung

LB 95

- E **Kennzeichen der verhaltensbedingten** (instrumentellen/operanten) **Konditionierung** (B. F. SKINNER)
- Ein ursprünglich zufällig ausgeführtes (**neutrales**) **Verhalten** wird durch einen Lernvorgang (**Konditionierung**) zu einem gezielt durchgeführten (**bedingten**) **Verhalten** (reversibler Lernvorgang).
 - **Kontiguität**: zeitgleiches Auftreten von **neutralem Verhalten** und Belohnung/Bestrafung
- E a) **bedingte Aktion** („Lernen am Erfolg“)
- durch Belohnung motiviertes aktives Wiederholen eines ursprünglich **neutralen Verhaltens**
 - **Beispiel**: Labormaus drückt auf einen Hebel, um Futter zu erhalten
 - Verlauf:
 - wiederholtes, zeitgleiches Auftreten (**Kontiguität**) einer positiven Erfahrung (Belohnung) mit einem zufällig ausgeführten (**neutralen**) **Verhalten** (Futtergabe nach Betätigung des Hebels)
 - Lernvorgang: Verknüpfung von **neutralem Verhalten** und positiver Erfahrung (**Konditionierung**) → Umwandlung des neutralen in ein **bedingtes Verhalten**
 - Ergebnis: aktive Wiederholung des **bedingten Verhaltens** in der Hoffnung auf erneute Belohnung
- E b) **bedingte Hemmung** („Lernen am Misserfolg“)
- durch Bestrafung motiviertes Vermeiden eines ursprünglich **neutralen Verhaltens**
 - **Beispiel**: Hund zerrt nicht mehr an seiner Leine
 - Verlauf:
 - wiederholtes, zeitgleiches Auftreten (**Kontiguität**) einer negativen Erfahrung (Bestrafung) mit einem zufällig ausgeführten (**neutralen**) **Verhalten** (Schmerz durch Stachelhalsband)
 - Lernvorgang: Verknüpfung von **neutralem Verhalten** und negativer Erfahrung (**Konditionierung**) → Umwandlung des neutralen in ein **bedingtes Verhalten**
 - Ergebnis: Vermeiden des **bedingten Verhaltens** aus Angst vor erneuter Bestrafung

Sozialverhalten

Kenntnisse

- Sozialverbände, Kooperation
- Kosten-Nutzen-Analyse und Optimalitätsmodell
- Fitness-Konzepte: direkte, indirekte und Gesamtfitness
- altruistisches Verhalten: Helfergesellschaften, Eusozialität, HAMILTON-Regel
- Kommunikation
- Aggression und Aggressionskontrolle
- Sexualverhalten

Fertigkeiten

- Interpretieren grafischer Darstellungen ethologischer Beobachtungsergebnisse
- Begründen des biologischen Sinns sozialer Verhaltensweisen
- Diskutieren der Kosten-Nutzen-Bilanz von Verhaltensweisen
- Diskutieren der Anwendbarkeit ethologischer Erkenntnisse auf den Menschen

1. Individuum und soziale Gruppe

E	Sozialverhalten: Verhaltensweisen, die sich auf Artgenossen beziehen	LB 100
E	Typen der Lebensweisen von Tieren	LB 102
	– Einzelgänger, z. B. Eichhörnchen	
	– anonymer Verband (Tiere kennen sich nicht individuell), z. B. Fischschwarm	
	– individualisierter Verband (Tiere kennen sich individuell), z. B. Wolfsrudel	
E	Vor- und Nachteile des Soziallebens	LB 102/103
	Kooperation: gemeinschaftliches Handeln (typisch für Tiere, die in Verbänden leben)	
	a) Vorteile:	
	– Schutz vor Feinden, z. B. Taubenschar gegen Habicht	
	• rechtzeitige Warnung: „Viele Augen sehen mehr als zwei.“	
	• Verwirrungseffekt: Fressfeind hat Probleme, sich auf ein Beutetier zu konzentrieren	
	• Verdünnungseffekt: Überlebenschance für das einzelne Tier erhöht	
	• Kooperation bei der Abwehr von Feinden: „In der Gruppe sind wir stark.“	
	– erleichterter Nahrungserwerb durch Kooperation beim Jagen, z. B. Wolfsrudel	
	– Kooperation bei der Aufzucht der Jungen (Arbeitsteilung), z. B. Kindergarten der Pinguine	
	b) Nachteile:	
	– Konkurrenz um Ressourcen (Artgenossen haben dieselben Ansprüche!)	
	– Gesundheitsprobleme: erhöhtes Infektionsrisiko; sozialer Stress	
	– größere Auffälligkeit gegenüber Fressfeinden	

2. Kosten-Nutzen-Analyse und Optimalitätsmodell

LB 101

E	Kosten-Nutzen-Analyse: Konzept zur Ermittlung, ob ein bestimmtes Verhalten einen Zugewinn an Fitness bewirkt = biologisch sinnvoll ist = sich evolutionär durchsetzen kann
	Kosten: die Fitness senkende Aspekte; Nutzen: die Fitness steigernde Aspekte
E	Optimalitätsmodell: größte Differenz zwischen Kosten und Nutzen = größte Fitness = optimale Verhaltensweise

3. Fitness-Konzepte (I): Direkte Fitness

W3/E	direkte Fitness („DARWIN-Fitness“): Beitrag eines Individuums zum Genpool der nächsten Generation = Fortpflanzungserfolg im Vergleich zu anderen Individuen in der Population	LB 105
	Jedes eigene Kind trägt 50 % der eigenen Allele . Jedes eigene Kind steigert somit den Anteil der eigenen Allele im Genpool der Population .	
	Eine bestimmte genetisch bedingte Verhaltensweise setzt sich evolutionär dann durch, wenn sie zur Fitness-Steigerung des betreffenden Individuums führt (Individualselektion). Die Theorie vom Verhalten zugunsten der „Erhaltung der Art“ ist nicht stichhaltig; es gibt keine „Gruppenselektion“, sondern nur den „Egoismus der Gene“.	
E	Infantizid (Kindstötung): unter dem Aspekt der Fitness-Steigerung des Individuums in bestimmten Fällen biologisch sinnvolles Verhalten	LB 118
	Beispiel: Männliche Löwen, die sich als Rudelführer durchgesetzt haben, töten anschließend oft die bereits vorhandenen kleinen Jungtiere.	
	– Weibchen kurz darauf wieder empfängnisbereit; diesmal tragen sie die Kinder des neuen Rudelführers aus	
	– Aufzucht der eigenen Kinder ohne Konkurrenz durch deren Halbgeschwister besser gesichert	
	– Nachkommen mit den Allelen des neuen Vaters ersetzen die Nachkommen des Vorgängers in kürzerer Zeit

4. Fitness-Konzepte (II): Indirekte und Gesamtfitness

LB 104/105

- E **indirekte Fitness** (soziobiologische **Fitness**): Beitrag (eng) verwandter Individuen zum Anteil der eigenen **Allele** im **Genpool** der nächsten Generation = Fortpflanzungserfolg von Eltern/Geschwistern/Kindern/...
- Da auch (enge) Verwandte einen Teil der eigenen **Allele** tragen und vererben können, steigert auch deren Fortpflanzungserfolg den Anteil der eigenen **Allele** im **Genpool** der nächsten Generation.
- E **Verwandtschaftskoeffizient (r)**: Wert für die (statistische) genetische Übereinstimmung zweier Individuen:
 - Bezugsorganismus/eineiige Zwillinge: 100 % = $r = 1$
 - Eltern/Vollgeschwister/eigene Kinder: 50 % = $r = 0,5$
 - Großeltern/Enkel/Halbgeschwister: 25 % = $r = 0,25$
- E **Gesamtfitness**: Summe aus **direkter** und **indirekter Fitness**
 Zur Beurteilung, ob ein Verhalten biologisch sinnvoll ist (= sich evolutionär durchsetzen kann), müssen sowohl **direkte** als auch **indirekte Fitness** berücksichtigt werden, denn beide haben einen Einfluss auf den Anteil der eigenen **Allele** im **Genpool** der nächsten Generation. Die ausschlaggebende Größe ist also die **Gesamtfitness**.
- E **Altruismus** (uneigennütziges Verhalten): Verhalten, das zugunsten der **Fitness** anderer Individuen die eigene **direkte Fitness** verringert, z. B. Ausstoßen von Warnrufen, Unterstützung anderer Individuen bei der Aufzucht von deren Nachkommen.
- E **HAMILTON-Regel**: **Altruistisches Verhalten** ist dann biologisch sinnvoll (= setzt sich evolutionär durch), wenn es die **Gesamtfitness** des betreffenden Individuums steigert. Der Verlust an **direkter Fitness** (= **Kosten**) muss durch den Zugewinn an **indirekter Fitness** (= **Nutzen**) also mehr als ausgeglichen werden.
Altruistisches Verhalten lohnt sich, wenn

$N \cdot r > K$	$N =$ Nutzen (Zugewinn durch indirekte Fitness) $r =$ Verwandtschaftskoeffizient $K =$ Kosten (Verlust an direkter Fitness)
-----------------	--
- E **reziproker Altruismus**: **altruistisches Verhalten** zwischen nicht oder kaum verwandten Individuen, das nach der **HAMILTON-Regel** biologisch unsinnig wäre; Prinzip: „Hilfst du mir, helfe ich dir.“
- E **Helfergesellschaften** (z. B. Blaubusch-Häher): Individuen unterstützen (stets oder für einige Zeit) die eigenen Eltern/Geschwister bei der Aufzucht von deren Nachkommen auf Kosten der eigenen Fortpflanzung
mögliche Vorteile: Steigerung der **indirekten Fitness**; spätere Übernahme des elterlichen **Reviere**
- E **Eusozialität**: **Kooperation** bei der Aufzucht der Nachkommen und der Nahrungsversorgung innerhalb von Tierverbänden, in denen es fruchtbare und unfruchtbare Individuen gibt; hoher Grad an **altruistischem Verhalten**; hoher Grad der Verwandtschaft der Individuen
Beispiel: Honigbiene (und andere staatenbildende Insekten, z. B. Ameisen, Termiten, ...)
 - Königin = **diploides** Weibchen (**Allele** AB)
 - Drohnen = **haploide** (!) Männchen, schlüpfen aus unbefruchteten Eiern (**Allele** C)
 - Arbeiterinnen = **diploide** Weibchen (**Allele** AC oder BC)
 Die **Haploidie** der Männchen hat Auswirkungen auf den **Verwandtschaftskoeffizienten**!
 - Arbeiterinnen (= Schwestern) untereinander: $r = 0,75$ (!)
 - Arbeiterinnen mit der Königin (= ihrer Mutter): $r = 0,5$**Folge**: Für weibliche Honigbienen ist es biologisch sinnvoller, ihre Geschwister aufzuziehen als selbst Kinder zu haben. Evolutionär führte dies zur Sterilität der Arbeiterinnen sowie zu einer ausgeprägten Arbeitsteilung innerhalb des **Tierstaats**.

5. Kommunikation

LB 106–109

- E **Kommunikation**: Übertragung von Informationen zwischen **Artgenossen**
- E **Sender-Empfänger-Modell**: **Sender** (Motivation zur **Kommunikation**) → **Codierung** (Verschlüsselung der Information in Form eines **Signals**) → Übertragung des **Signals** → **Decodierung** (Entschlüsselung des **Signals**) → **Empfänger** (Reaktion auf das **Signal**)
 Der Erfolg der **Kommunikation** kann an jeder Stelle des Modells beeinträchtigt sein.
- E **Signalarten**
 - **akustische Signale** Rufe, Schreie, Gesänge, Sprache
 - **optische Signale** Körperfärbung, Gestik, Mimik
 - **chemische Signale (Pheromone)** Duftmarken, Körpergeruch
 - **taktile Signale** Berührungen, gegenseitige Körperpflege
- E **Ritualisierung**: Verhaltensweise, die ihren ursprünglichen Sinn verloren hat und nun als **Kommunikationsmittel** dient
 - **Beispiele**: Balzrituale, Beschwichtigungsgesten, Drohgebärden, Begrüßungsrituale, Kuss
 - **Kennzeichen**: Verhaltensweise vereinfacht, Darbietung überdeutlich, oft rhythmisch wiederholt

W3/E **Kosten-Nutzen-Bilanz der Kommunikation:** Eine bestimmte **Kommunikationsmethode** setzt sich evolutionär nur dann durch, wenn sie die **Gesamtfitness** durchschnittlich steigert (Beispiele: Warnrufe, auffällige Körperfärbungen, ...)

W3/E **Signalfälschung: Mimikry** (Scheinwartracht), Anlocken von Beute, Imponiergehabe

6. Aggressionsverhalten

LB 110

E **Aggression:** Verhaltensweisen des Angriffs oder der Verteidigung, die den Gegner unterwerfen oder vertreiben sollen

E **Intensitätsstufen der Aggression**

1. **Imponieren** und **Drohen**

- Vergrößerung des Körperumrisses
- Zeigen der Waffen
- Laute/Farben als **Warnsignale**

2. **Kommentkampf** (Turnierkampf)

- **ritualisierter** Kampf (feste Regeln, erfolgt in **Handlungsketten** = Folge von **Instinkthandlungen** mit jeweils spezifischen **Schlüsselreizen**)
- Kräftemessen ohne Tötungsabsicht: Einsatz der weniger gefährlichen Waffen; Attackieren der weniger empfindlichen Körperteile
- Beenden des Kampfes durch **Unterwerfungsgeste**, die beim Überlegenen als **Schlüsselreiz** eine **Tötungshemmung** auslöst, und anschließende Flucht des Unterlegenen; ist die Flucht unmöglich, kommt es möglicherweise zum

3. **Beschädigungskampf**

- ohne Regeln, unter Einsatz aller Waffen, mit Tötungsabsicht

7. Aggressionskontrolle

LB 111/112

E **Rangordnung:** hierarchische Reihenfolge der Tiere in einem **individualisierten Verband**, die durch **Kommenkämpfe** festgelegt wird und über längere Zeit Bestand hat

- **lineare Rangordnung:** ranghöchstes Tier (**α -Tier**) $\rightarrow \dots \rightarrow \dots \rightarrow$ rangniedrigstes Tier (**ω -Tier**)
- **Vorteil:** Stabilität durch Vermeidung ständiger Konflikte $\rightarrow$ Energieeinsparung $\rightarrow$ **Fitness-Steigerung**
- **Beispiele:** Hackordnung bei Hühnern, Wolfsrudel

E **Territorialverhalten:** Abgrenzung und Verteidigung eines **Reviers** (Wohn-, Jagd-, Balz-, Brutrevier)

- Markierung der **Reviergrenzen** (z. B. durch **chemische** oder **akustische Signale**)
- **Kosten-Nutzen-Bilanz** bestimmt über die **Reviergröße**

8. Ursachen von Aggressionsverhalten

LB 113–115

E **proximate Ursachen:** Hormonhaushalt (z. B. im Jahreszeitenrhythmus), innerer Versorgungszustand, Verfügbarkeit von Ressourcen, **Populationsdichte** (sozialer Stress)

E **ultimate Ursachen:** **Kosten-Nutzen-Analyse** mit Hilfe der Spieltheorie

„**Taube-Falke-Modell**“ (J. M. SMITH, 1973)

- „**Taube**“ verhält sich friedlich und scheut Auseinandersetzungen
- „**Falke**“ ist aggressiv und verhält sich risikofreudig

Ergebnisse der Simulationen:

- Taube vs. Taube: 15 Punkte für beide
- Falke vs. Falke: -25 Punkte für beide
- Falke vs. Taube: 50 Punkte für den Falken

Folgerung: **Falken-Verhalten** ist nur so lange vorteilhaft, wie der Großteil der **Population** aus **Tauben** besteht und somit die Wahrscheinlichkeit, auf einen weiteren Falken zu treffen, gering ist. Nimmt der Anteil aggressiver Tiere zu, wird er aufgrund des ebenfalls zunehmenden **Fitness-Verlustes** für die Falken wieder reduziert.

Modellerweiterung: „**Bourgeois**“ (Großbürger) verhält sich als **Revierbesitzer** wie ein **Falke**, als Eindringling wie eine **Taube**

Ergebnisse der Simulationen:

- Bourgeois vs. Bourgeois: 25 Punkte für beide, also größere **Fitness-Steigerung** als bei den anderen Direktkonfrontationen (**Taube vs. Taube**; **Falke vs. Falke**)
- Gewinn für **Falken** bzw. **Tauben** als Angreifer des **Bourgeois** nur 12,5 Punkte bzw. 7,5 Punkte, also weniger als ein **Bourgeois**

Folgerung: **Bourgeois-Verhalten** = „Optimallösung“; Individuen, die in einer **Bourgeois-Population** **Tauben-** oder **Falken-Verhalten** zeigen, haben einen **Fitness-Nachteil** $\rightarrow$ werden **selektiert**. **Bourgeois-Verhalten** = **evolutionsstabile Strategie**

9. Sexualverhalten LB 116–118

- E Partnerfindung und -bindung**
- **Investment:** Kosten für Partnerfindung, -bindung und Aufzucht des Nachwuchses
 - **optische, akustische, chemische Signale** („Ornamente“) zum Erkennen und Anlocken von Geschlechtspartnern; evtl. **Kommentkämpfe** und/oder Geschenke
 - Überwindung dreier Hürden:
 - Identifizierung des Partners als kompatiblen **Artgenossen** (**sexuelle Prägung**)
 - Ausschalten des **Aggressionsverhaltens** durch **Balzverhalten** (**Ritualisierungen**)
 - Feinsynchronisation des Paarungsaktes (**Instinkthandlungen** in **Handlungsketten**)
- E Paarungssysteme**
1. **Monogamie:** ein Pärchen, z. B. Gibbons
Vorteile: geringes **Investment**, da nur eine Partnerfindung/-bindung; intensive Pflege des Nachwuchses
Nachteil: Fortpflanzungserfolg auf Männchen und Weibchen aufgeteilt, d. h. „Qualität vor Quantität“
 2. **Polygamie:** mehr als zwei Partner
 - 2.1 **Polygynie:** ein Männchen, mehrere Weibchen („Harem“), z. B. Gorillas
Vorteile: Maximierung des Fortpflanzungserfolgs für das Männchen
Nachteile: starke **Konkurrenz** unter den Männchen, hohes **Investment**, mögliche starke **Konkurrenz** unter den Weibchen des **Harems**, z. B. bei unzureichenden Nahrungsressourcen im **Revier**
 - 2.2 **Polyandrie** (selten): ein Weibchen, mehrere Männchen, z. B. Zwergseidenäffchen
Vorteile: höherer Fortpflanzungserfolg für das Weibchen, mögliche **Fitness**-Steigerung des Nachwuchses durch genetische Diversität, z. B. bei wechselnden Umweltbedingungen
Nachteile: deutlich geringerer Fortpflanzungserfolg für die Männchen
 - 2.3 **Polygynandrie/Promiskuität:** mehrere Männchen und Weibchen, z. B. Schimpansen, Bonobos
Vorteile: hoher Fortpflanzungserfolg für Männchen und Weibchen, gute Pflege für den Nachwuchs durch Beteiligung vieler „Eltern“, Möglichkeit zur Erweiterung der Bedeutung des **Sexualverhaltens**, z. B. auf den Bereich der **Aggressionskontrolle**
Nachteil: **Konkurrenz**
- Jedoch sind selbst innerhalb einer Art, z. B. in Abhängigkeit von den Umweltbedingungen, auch unterschiedliche **Paarungssysteme** möglich.

griech.:
 gyn- = weiblich
 andr- = männlich

Operatoren in Aufgabenstellungen

Nennen Sie ... / Benennen Sie ... / Beschriften Sie ... / Geben Sie an ...	Aufzählen von Elementen, Begriffen, Sachverhalten, Daten ohne irgendwelche Erläuterungen
Skizzieren Sie ...	Anfertigen einer einfachen Bleistift-Skizze eines Objektes oder Vorgangs, ggf. Farben zur Verdeutlichung bestimmter Aspekte (auf akzeptable Größe und saubere Strichführung achten! Beschriftungslinien mit dem Lineal ziehen!)
Beschreiben Sie ... / Stellen Sie dar ...	zusammenhängendes Beschreiben eines Objektes oder Darstellen eines Vorgangs unter Einbeziehung der Fachsprache
Vergleichen Sie ...	Gegenüberstellen von Gemeinsamkeiten und Unterschieden, ggf. in Tabellenform
Erklären Sie ...	Einordnen eines Sachverhaltes in einen größeren Zusammenhang, um zu verdeutlichen, warum es zu dem geschilderten Phänomen gekommen ist (Beantwortung der Frage nach dem „Warum?“)
Erläutern Sie ...	Einordnen eines Sachverhaltes in einen größeren Zusammenhang unter Einbeziehung von (ggf. selbst gewählten) Beispielen
Begründen Sie ...	Darstellen des Zusammenhanges zwischen Ursache und Wirkung im Falle des geschilderten Phänomens
Diskutieren Sie ... / Erörtern Sie ...	Gegenüberstellen von Argumenten (Pro und Contra) und Ableiten einer Schlussfolgerung
Leiten Sie ab ...	Ermittlung der Antwort zu einem Problem unter Verwendung der gegebenen Materialien mit Angabe des Lösungsweges
Entwickeln Sie eine Hypothese ... / Stellen Sie eine Hypothese auf ...	zusammenhängende, folgerichtige Darstellung einer denkbaren Erklärung für ein geschildertes Phänomen
Interpretieren Sie (das Diagramm) ...	<ol style="list-style-type: none"> 1. „Erster Satz“: „Das Diagramm stellt die Abhängigkeit der [y-Achse] von der [x-Achse] bei ... dar.“ 2. Beschreibung des Kurvenverlaufs / der Säulenlängen / ... (= Was hat man beobachtet?) 3. Erklärung des Kurvenverlaufs (= Warum ist das so?)